

Wie viel ist zu viel? Vom Genuss zur Suchterkrankung

Dir. Prim. Dr. Christian Korbel

57. Linzer Psychiatrischer Samstag

Grenzen psychischer Erkrankungen

Conclict of interest

- Astra Zeneca, Amomed, Bristol-Myer Squibb, Chiesi, Casino Austria, Indivior, Jansen, Lundbeck, Lilly, Madaus, Mundipharma, ÖBB, Lannacher, RB Pharmaceutics, Reckitt Benckiser, Pfizer, MSD, Abbvie
- Land NÖ, Landesklinikum Mauer

Landesklinikum Mauer



Prim. Dr. Christian Korbel

Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen



Prim. Dr. Christian Korbel

Wieviel ist zu viel?

Abstinenz

Konsum

Überdosis

Überblick Alkohol-/Drogenkonsum

At a glance — estimates of drug use in the European Union

Cannabis


Adults (15–64)

Last year use



22.6 million
7.9 %

Lifetime use



84 million
29.3 %


Young adults (15–34)

Last year use



15.3 million
15.1 %


National estimates of use in last year (%)



Cocaine

Adults (15–64)

Last year use



3.7 million
1.3 %


Lifetime use



15.5 million
5.4 %


Young adults (15–34)

Last year use



2.3 million
2.3 %

National estimates of use in last year (%)




This page is part of the [European Drug Report 2023](#), the EMCDDA's annual overview of the drug situation in Europe.

MDMA


Adults (15–64)

Last year use



2.3 million
0.8 %

Lifetime use




11.5 million
4.0 %

Amphetamines


Adults (15–64)

Last year use



2.0 million
0.7 %


Lifetime use



10.3 million
3.6 %

Young adults (15–34)

Last year use



1.8 million
1.8 %

National estimates of use
in last year (%)


Lowest 0.2

Highest

7.8

Young adults (15–34)

Last year use



1.3 million
1.3 %

National estimates of use
in last year (%)

Lowest 0

Highest


3.5

This page is part of the [European Drug Report 2023](#), the EMCDDA's annual overview of the drug situation in Europe.


Heroin and other opioids

High-risk opioid users
1 million
511 000
opioid users received agonist treatment in 2021

Drug treatment requests
Principal drug in about 25 % of all drug treatment requests in the European Union



Fatal overdoses
Opioids were found in 74 % of fatal overdoses



European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2023), *European Drug Report 2023: Trends and Developments*, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_en

Alkoholkonsum in Österreich

11,4 l Reinalkohol pro Kopf pro Jahr,

24 g/ Tag


103,6 l Bier/ 25,7 l Wein

Alkoholkonsum seit 1970 rückläufig

Alkoholkonsumverhalten in A bewegt sich in Richtung Mäßigung



Abbildung 5.1
Anteil am konsumierten Reinalkohol nach Konsumklassen



Überdosis

Tödliche Intoxikation

Alkohol

- Selten
- 3-4 Promille gefährlich
- 4-6 % oft tödlich aber wurde auch schon überlebt
- Suizidale Absicht
- Atemdepression
- Methanolvergiftung

Opioide

- Häufig
- Abhängig von der Gewöhnung
- Toleranz geht bei Abstinenz rasch zurück
- Risiko, Haftentlassung, nach Entzugsbehandlung
- Atemdepression
- Toxische Begleitstoffe

Grüner Knollenblätterpilz *Amanita phalloides*

Amatoxin Amanitin

0,1 Milligramm pro kg KG


7-10 mg tödlich , weniger als
ein Pilz

Brechdurchfall,
Leberschädigung, Zerfall,
Coma hepaticum




MDMA

- Über 1,5 mg pro kg KG für Männer
- Über 1,3 mg pro kg KG für Frauen
- IST ZU VIEL
- Frau 60 kg x 1,3 = max. 78 mg MDMA



safer
party
.ch



Louis Vuitton extrem hochdosierte MDMA-Pille

Informationen zur getesteten Substanz:

MDMA: 220.3 mg

Dicke	Länge x Breite	
3.8 mm	16.3 x 8.2 mm	
Gewicht	Farbe	Bruchrille
556.5 mg	Rosa	Ja

Testort: Zürich (DIZ), 31.10.2023

safer
party
.ch



Netflix extrem hochdosierte MDMA-Pille

Informationen zur getesteten Substanz:

MDMA: 202.3 mg

Dicke	Länge x Breite	
4.1 mm	12.2 x 8.1 mm	
Gewicht	Farbe	Bruchrille
416 mg	Pink	Ja

Testort: Bern (DIB), 01.11.2023

safer
party
.ch



The Punisher

extrem hochdosierte MDMA-Pille

Informationen zur getesteten Substanz:

MDMA: 216.0 mg

Dicke	Länge x Breite	
4.8 mm	11.9 x 13.9 mm	
Gewicht	Farbe	Bruchrille
507.7 mg	Hellblau	Ja

Testort: Basel (DIBS) 19.06.2023

safer
party
.ch



Cannabis mit synthetischem Cannabinoid



Informationen zur getesteten Substanz:


THC: 3.2 %

CBD: 11.1 %

ADB-BUTINACA: Menge nicht bestimmbar

Testort: Zürich (DIZ) 27.10.2023





Österreichisches Standardglas

20 Gramm Alkohol

Abbildung 2.1:
Österreichisches Standardglas (ÖSG)



Darstellung: GÖG

Risiko Gesundheitsschäden	Männer	Frauen
Niedrig		
Standarddrinks	0-4 pro Tag	0-2 pro Tag
Reiner Alkohol	bis 40 g	bis 20 g
Mittel		
Standarddrinks	4-6 pro Tag	2-4 pro Tag
Reiner Alkohol	40g-60 g	20g-40g
Hoch		
Standarddrinks	6-10 pro Tag	4-6 pro Tag
Reiner Alkohol	60g-100g	40g-60g
Sehr Hoch		
Standarddrinks	> 10 pro Tag	> 6 pro Tag
Reiner Alkohol	> 100 g	> 60 g

Risikoklassen der WHO, WHO/EMA

ICD-10 F10.2

Alkoholabhängigkeit

Starkes Verlangen oder Zwang die Substanz zu konsumieren

Verminderte Kontrolle über den Substanzzkonsum


Entzugssyndrom

Toleranzentwicklung

Einengung auf den Substanzzgebrauch
(Vernachlässigung anderer Bereiche)

Anhaltender Substanzzgebrauch trotz schädlicher Folgen

Mind. 3 der 6 Kriterien müssen erfüllt werden



Pablo Picasso, Absinth-Trinker

ICD-11 Disorder due to substance use or addictive behaviors


Mehr Substanzgruppen

Verhaltenssüchte

Glückspiel, Gaming,

Einfachere Diagnostik (3 Kriterien)





*Drei Pflanzen
Haben sie gesagt...*

Kontakt

Landesklinikum Mauer
Ärztliche Direktion
ÄD Prim. Dr. Christian Korbel
christian.korbel@mauer.lknoe.at



Prim. Dr. Christian Korbel